# 採血データ

| | | | | | 重要視 | 注意 | 低値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 10/1 | 10/15 | 11/1 | 11/15 | 12/1 | 12/16 | 正常値低値 | 正常値高値 |
| プレドニン服用量(mg) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | |
| AST(GOT) | 21.0 | | 22.0 | | 21.0 | | 10.0 | 37.0 |
| ALT(GPT) | 21.0 | | 24.0 | | 23.0 | | 5.0 | 37.0 |
| LDH | 220.0 | | 205.0 | | 239.0 | | 120.0 | 243.0 |
| ALP | 286.0 | | 266.0 | | 286.0 | | 115.0 | 337.0 |
| r-GTP | 30.0 | | 32.0 | | 34.0 | | 6.0 | 53.0 |
| 総蛋白 TP | 6.7 | | 6.7 | | 7.2 | | 6.2 | 8.1 |
| CK | 55.0 | 155.0 | 55.0 | 85.0 | 57.0 | 119.0 | 41.0 | 185.0 |
| アミラーゼ | 91.0 | | 88.0 | | 106.0 | | 35.0 | 118.0 |
| 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ T-Cho | 220.0 | | 236.0 | | 263.0 | | 150.0 | 219.0 |
| 中性脂肪 T-G | 96.0 | | 93.0 | | 194.0 | | 50.0 | 149.0 |
| HDL-C | 51.0 | | 65.0 | | 62.0 | | 40.0 | 80.0 |
| LDL-C | 149.8 | | 152.4 | | 162.2 | | 70.0 | 139.0 |
| 尿素窒素 | 19.0 | | 17.5 | | 18.2 | | 7.0 | 21.8 |
| クレアチニン | 0.62 | | 0.68 | | 0.68 | | 0.3 | 0.9 |
| 尿酸 | 4.9 | | 5.3 | | 5.7 | | 3.5 | 6.9 |
| Na | 144.0 | | 141.0 | | 144.0 | | 138.0 | 149.0 |
| K | 4.0 | | 5.3 | | 6.0 | | 3.5 | 4.8 |
| CI | 102.0 | | 100.0 | | 101.0 | | 99.0 | 110.0 |
| Ca | 8.9 | | 9.2 | | 9.5 | | 8.2 | 10.0 |
| 血糖 （空腹時） | 88.0 | | 94.0 | | 112.0 | | 70.0 | 109.0 |
| HbA1c | 6.5 | | 6.2 | | 6.2 | | 4.6 | 6.2 |
| CRP | 0.28 | | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.07 | 0.3以下 | |
| ASO | 18.0 | | 20.0 | | 18.0 | | 成人244IU/ml以下 | |
| A/G 比 | | | | | | | | |
| 白血球 | 11680.0 | | 9340.0 | | 9380.0 | | 3500.0 | 9700.0 |
| 赤血球 | 471.0 | | 479.0 | | 498.0 | | 438.0 | 577.0 |
| ヘモグロビン | 14.5 | | 14.8 | | 15.0 | | 13.6 | 18.3 |
| ヘマトクリット | 44.8 | | 45.2 | | 47.9 | | 39.0 | 52.0 |
| MCV | 95.0 | | 94.0 | | 96.0 | | 84.0 | 99.0 |
| MCH | 30.8 | | 30.9 | | 30.1 | | 27.0 | 35.0 |
| MCHC | 32.4 | | 32.7 | | 31.3 | | 31.0 | 36.0 |
| RDW | | | | | | | 11.0 | 14.3 |
| 血小板数 | 25.1 | | 26.0 | | 29.5 | | 14.0 | 37.9 |
| NEUT | | | | | | | 40.0 | 74.0 |
| Segment | 86.0 | | 82.0 | | 78.0 | | 27.0 | 72.0 |
| LYMP | 3.0 | | 6.0 | | 12.0 | | 19.0 | 48.0 |
| MONO | 6.0 | | 5.0 | | 5.0 | | 3.4 | 9.0 |
| EOS | 0.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 0.0 | 7.0 |
| BASO | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 1.5 |
| Stab | 4.0 | | 6.0 | | 4.0 | | 0.0 | 19.0 |
| リウマチ因子（RF） | | | | | | | 15以下 | |
| ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ-血清 | 58.5 | 69.8 | 61.7 | 67.5 | 70.4 | 50.3 | 60以下 | |
| ＃ 抗核抗体/FA | 640.0 | | 640.0 | | 1280.0 | | 80未満 | |
| ＃ SPECKLED | 640.0 | | 640.0 | | 1280.0 | | 80未満 | |
| LEテスト | （－） | | | | | | （－） | |
| C3(β1C/β1A) | 130.0 | | 110.0 | | 126.0 | | 80.0 | 140.0 |
| C4(β1E) | 52.6 | | 36.5 | | 43.8 | | 11.0 | 34.0 |
| インスリン 空腹 | | | | | | | 2.2 | 12.4 |
| #PTH-C | | | | | | | 1．3以下 | |
| アルブミン／Cre補正 | | | | | | | 18.0以下 | |
| アルブミン定量値 | | | | | | | | |
| クレアチニン尿 | | | | | | | | |